

注射用艾司奥美拉唑钠与注射用白眉蛇毒血凝酶 存在配伍禁忌

魏海霞 杨援 陈君怡

(联勤保障部队 940 医院门诊部 ,兰州 730050)

关键词 艾司奥美拉唑钠 注射用;白眉蛇毒血凝酶 注射用;配伍禁忌

中图分类号 R975.2; R969.3 文献标识码 B 文章编号 1004-0781(2018)12 增-0077-01

DOI 10.3870/j.issn.1004-0781.2018.z1.028

注射用艾司奥美拉唑钠为类白色的块状物或白色粉末,适用于反流性食管炎、胃溃疡、急性胃溃疡或者十二指肠溃疡出血患者,是一种强效质子泵抑制剂。注射用白眉蛇毒血凝酶为白色或类白色块状物或粉末,无臭,易溶于水,适用于需要减少血流或止血的各种医疗情况等。笔者在给患者输液时发现注射用艾司奥美拉唑钠与注射用白眉蛇毒血凝酶存在配伍禁忌,报道如下。

1 临床资料

患者,男,66岁,因“十二指肠溃疡伴消化道大出血”于2016年9月10日由急诊科收住。入院后给予禁食水,胃肠减压,注射用艾司奥美拉唑钠(阿斯利康药业有限公司,规格:40 mg,商品名:耐信,批准文号:国药准字 H20093314) 40 mg+0.9%氯化钠注射液 5 mL 缓慢静脉推注,注射用白眉蛇毒血凝酶(锦州奥鸿药业有限公司,规格:2 U,商品名:邦亭,批准文号:国药准字 H20080427) 2 ku+0.9%氯化钠注射液 10 mL 缓慢静脉推注。在输液过程中发现,当注射用艾司奥美拉唑钠经同一静脉通路延长管与注射用白眉蛇毒血凝酶交汇时,交汇处出现了白色浑浊样改变。随即停止静脉推注并回抽药液,更换输液器另建一条静脉通路于对侧肢体继续静脉注射用艾司奥美拉唑钠,并密切观

察患者生命体征及病情变化,同时报告主管医生,并复查血常规及肝、肾功能,电解质,均未发生异常。

2 实验方法与结果

为了确定注射用艾司奥美拉唑钠与注射用白眉蛇毒血凝酶是否存在配伍禁忌,进行如下分析:①查阅有关资料,注射用白眉蛇毒血凝酶与注射用艾司奥美拉唑钠说明书。《400种西药注射临床配位应用检索表》表中及说明书均无注射用艾司奥美拉唑钠与注射用白眉蛇毒血凝酶存在配伍禁忌的记载;②药物配伍实验,常温下选用一支 20 mL 无菌注射器抽取艾司奥美拉唑钠 40 mg 和注射用白眉蛇毒血凝酶 2 kU 混合,两种药混合后立即出现白色浑浊样改变,无白色絮状物产生,静置 10 min 后振荡后不消失。1 h 后逐渐变为浅黄色浑浊液体;1.5 h 后逐渐变为灰黄色;2 h 后逐渐浅灰色;6 h 后逐渐变为灰色浑浊液体,实验证明两种药物存在配伍禁忌。

3 建议

临床护理工作中,若遇到患者需使用注射用艾司奥美拉唑钠与注射用白眉蛇毒血凝酶时,应从不同的静脉通路单独给药或在两种液体之间间隔一组 0.9% 氯化钠注射液 50 mL 冲洗管道。为确保临床用药安全,使用前应先查阅药物配伍禁忌表及药物说明书,注意药物的理化性质、不良反应及相互作用,无禁忌再用。输液过程中一旦发现药物有变色、浑浊、沉淀、絮状物等现象时,应立即采取相应措施,保证患者的用药安全。

收稿日期 2017-08-07 修回日期 2018-02-07

作者简介 魏海霞(1979-),女,甘肃兰州人,护师,学士,从事护理工作。电话:0931-8994786, E-mail: 2310330372@qq.com。